

Loyant™ PILIHAN YANG TERBAIK KARENA:



Spektrum Luas Termasuk Untuk Gulma yang Sulit Dikendalikan



Echinochloa crus-galli

Monochoria vaginalis

Spenochlea zeylanica

Ludwigia octovalvis

Fimbristylis miliacea

Cyperus difformis

Cyperus iria



Bekerja 2 kali lebih cepat

- Golongan Daun Lebar (0.5 - 1 hari)
- Golongan Rumputan (1 - 3 hari)
- Golongan Tekian (3 - 5 hari)



Hemat Biaya

Tidak perlu matun dan tidak perlu semprot berkali-kali

CARA MENGGUNAKAN Loyant™ UNTUK HASIL TERBAIK

Waktu Penggunaan



10-14 hari setelah tanam

2-3 helai daun gulma (10-14 HST)

Dosis



Gunakan **Loyant™** 1 Liter/Hektar

Tepat Cara



kondisi macak-macak saat aplikasi | airi lahan 2 HSA, 3-5 cm selama 7 hari | gunakan Nosel Kipas

Untuk Gulma Timunan/Dengkulan/Ace Ace Gunakan Clincher 100 EC

Clincher™ 100 EC

HERBISIDA



Timunan/Dengkulan/Ace-ace
Leptochloa chinensis



Dosis dan Waktu Aplikasi



5 Botol: 800ml-1000ml/1 Hektar

1 Hektar Lahan Padi

Aplikasikan **Clincher™** 100 EC pada umur padi 10 - 15 HST (Stadia 3 - 5 Daun Gulma)

Loyant™ 25 EC

Rinskor™ active

HERBISIDA

“Panen Terjaga, Hidup Sejahtera”



TAHUKAH ANDA?

Penyerapan pupuk menjadi tidak optimal

Biaya tenaga kerja matan semakin sulit dan biaya semakin tinggi

Kompetisi gulma menyebabkan potensi PANEN berkurang 10 -15 % bahkan bisa kehilangan hasil dapat mencapai 86% jika tanpa pengendalian gulma (Jurnal Agro Indonesia, 2016)

Jaga Potensi Hasil Anda Dengan Loyant™

Waktu dan Dosis Pemakaian Loyant™ Untuk Hasil Terbaik

Gunakan Loyant™ pada saat Gulma 2-3 helai daun atau umur pada 10 - 14 Hari Setelah Tanam



Dosis :
1 L/Ha atau 2 Botol per Ha

HST
(Hari
Setelah
Tanam)



Terbukti Lebih Cepat
Lahan bersih, bebas dari gulma.
Novlect™ bekerja sejak hari pertama

Terbukti Lebih Tuntas
Hemat aplikasi dan biaya



Terbukti Potensi Hasil Lebih Terjaga